



雷允上

- 全国独家
- 医保乙类
- 国家基药



预防复发 滴丸更佳

脑安滴丸

国药准字Z20194059

雷允上药业集团有限公司
安徽誉隆亚东药业有限公司



扫描全能王 创建

标准化治疗后缺血性脑卒中仍呈现高复发率^[1]

中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作
二级预防指南 2014

中华医学会神经病学分会 中华医学会神经病学分会脑血管病学组

数据显示:我国缺血性脑卒中年复发率高达**17.7%**




缺血性卒中

脑安有效降低脑缺血性事件发生率, 预防复发^[2]


入选240例急性脑梗死患者, 随机分成2组, 平均治疗并随访1年

对照组—拜阿司匹林100mg+阿托伐他汀钙片20mg 120例 脑安组—拜阿司匹林100mg+阿托伐他汀钙片20mg+脑安胶囊4粒 120例

两组患者随访期间脑血管意外事件发生情况



两组治疗前后NIHSS评分比较



结论: 常规治疗加用脑安可用于缺血性脑卒中患者的二级防护

脑安的作用机制与特点



参考文献:

- [1] 中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014[J]. 中华神经科杂志, 2015;48(4):258-273.
 [2] 陈伟康, 蓝丽康, 卢丽萍, 等. 脑安胶囊在缺血性卒中二级预防中的作用[J]. 中国中医药科技, 2016, 23(2):136-138.
 [3] 张旭静, 范柳, 王春安, 等. 脑安胶囊不同制剂对大鼠血小板聚集的影响[J]. 中国临床康复, 2003, 7(19):2680-2681.




扫描全能王 创建



脑安有效改善脑血管功能, 疗效确切, 可长期使用 [6]

采用多中心, 随机对照研究进行药物干预方案, 入组1088例脑卒中高危人群
 脑安胶囊组—559例 口服脑安胶囊, 2粒/次, 2次/天 阿司匹林组—529例 隔日一次, 100mg/次, 服药时间2年




结论: 干预1年、2年, 脑安组的脑血管功能积分值明显高于阿司匹林组 (P<0.01)



脑安有效降低血脂 [2]

入选240例急性脑梗死患者, 随机分成2组, 平均治疗并随访1年
 对照组—拜阿司匹林100mg+阿托伐他汀钙片20mg 120例 脑安组—拜阿司匹林100mg+阿托伐他汀钙片20mg+脑安胶囊4粒 120例




结论: 治疗1年后, 脑安组总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)显著低于对照组 (P<0.05)



脑安有效减少炎症反应, 保护神经功能 [5]

对照组—口服阿司匹林肠溶片300mg, 阿托伐他汀钙片20mg, 单硝酸异山梨酯片20mg, 1次/天
 治疗组—在常规治疗基础上在患者入院后立即加用脑安胶囊, 2次/天, 2粒/次



结论: 脑安可减轻炎症反应, 治疗后NIHSS评分低于治疗前 (P<0.01)

参考文献:

- [4] 王丽娟, 陈薇, 俞荣华, 等. 脑安胶囊改善脑血管功能状况的临床观察[J]. 临床神经病学杂志, 2004, 17(6): 476-477.
- [5] 朱凤军. 脑安胶囊对急性脑梗死患者血清IL-1β、IL-6和NF-κB的影响[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2012, 15(22): 80-81.
- [6] 刘红梅, 江滨, 黄久仪, 等. 中药脑安胶囊在社区脑卒中高危人群干预管理应用再评价[J]. 中华健康管理学杂志, 2018, 12(5): 415-419.



脑安滴丸的独特优势

- ✓ **剂型先进**: 滴丸剂型采用固体分散技术, 易吸收, 起效快;
- ✓ **疗效持久**: 滴丸剂型具有缓释的特性, 能延长药效, 增加产品疗效;
- ✓ **安全性高**: 滴丸剂型能增加生物利用度, 减少用量, 降低胃肠道刺激, 副作用小。

“三小”: 用量小、毒性小、副作用小 “三效”: 高效、长效、速效

《脑血管疾病安全用药手册》推荐



《脑血管疾病安全用药手册》:

- 1、脑安是预防短暂性脑缺血发作患者发生卒中的有效药品;
- 2、中风病后遗症期, 脑安是药效持久、安全、适合长期服用的优选药品。

脑安滴丸联合用药方案

抗血小板药

+

他汀类药

+

脑安滴丸

脑安滴丸是缺血性脑卒中恢复期联合用药的品质之选

脑安滴丸说明书

- 【药品名称】** 脑安滴丸
【成分】 川芎、当归、红花、人参、冰片。
【性状】 本品为黑褐色至黑色的滴丸; 气清香, 味苦。
【功能主治】 活血化痰, 益气通络。适用于脑血栓引起的半身不遂, 偏身麻木, 语言不利, 口舌歪斜及偏头痛(血管-神经性头痛)引起的健忘、头晕、恶心、畏光怕声、神疲乏力, 属于气虚血瘀证候者。
【规格】 每粒重50mg。
【用法用量】 口服。一次20粒, 一日2次, 疗程为4周。
【不良反应】 少数患者服药后可出现轻度恶心、胃胀。
【禁忌】 孕妇禁用, 产妇产后慎用; 出血性中风慎用; 少数患者服药后可出现轻度恶心、胃胀。
【包装】 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装。每袋20粒, 每盒6袋/10袋。
【批准文号】 国药准字Z20194059
【企业名称】 安徽誉隆亚东药业有限公司
【生产地址】 安徽省亳州市经济开发区百合路1177号
【邮政编码】 236800
【电话号码】 0558-2809096



内部资料 仅供专业人士阅读



扫描全能王 创建